Observation Anatomique sur deux Enfans de sexe feminin Néa à terme, de Grandeur et Grosseur ordinaire, joints l'un a l'autre par la partie superieure de la poitrine, par la Region Epigastrique et Vmbilicale.

Le jeu de la nature dont on presente l'Observation contient des singularités si variées, si interressantes, que j'ay crû devoir en faire l'Examen, avec le plus de fidelité et d'Exactitude qu'il m'a été possible.
La femme d'un nommé Law Musicien au Reg.t D'hainault Entra dans le travail de l'Enfantement le dix du mois de May de la presente année 1766. sur les dix heures du soir, dés ce moment la matrice s'etoit dilaté insensiblement, mais la tete de l'Enfant tomba dans le petit bassin, et depuis nimait s'engagea au passage; la Matrone fit ce qu'elle pût pour en procurer la sortie sans aucun succés, lorsqu'elle apperçeut une seconde tete qui formoit obstacle a l'accouchement. Ce fut dans cet Etat d'Embarras que la matrone demanda du secours; j'y fut mandé le lendemain onzieme du mois a sept heures du matin; je donnai toute l'attention que demandoit l'Exposé de la matrone.
Je Reconnus en Effet la tete Engagée au passage qui aprés l'avoir touché, me parut avoir trés peu de vigueur; j'y remarquai aussi une seconde te[...] L'ysebyoudroit: je m'assurai de l'Etat et de la situation par un Ex[...] et je trouvai que les deux Enfans etoient unis.
J'agis en consequence avec tout le menagement possible, entrés peu de [...] parvins à faire l'accouchement sans le secours d'aucun [...] heureusement, mon attention me porta ensuitte a observer ces deux Enfan[s]
Je reconnû un seul cordon Umbilical, dont je fis la ligature et [la] section, ce cordon repondoit a un seul placenta, mais beaucoup plus volumineux qu'il ne se rencontre ordinairement; ayant debouché ces Enfans, ils rendirent chacun leur meconium, et a la sortie de l'Eglise ou les deux Enfans avoient reçu le bapteme, on les transporta chez moi:
L'Enfant qui m'avoit parû avoir moins de vigueur quoique plus volumineux que le second, etoit mort, l'autre se portoit bien et parroissoit avoir plus de force. Je fis inviter plusieurs medecins et Chirurgiens, ces Messieurs assemblés Nous avons reconnû qu'il n'etoit pas possible de risquer aucune operation pour separer l'Enfant mort du vivant vüe la trop grande intimité et union qu'il y avoit entre les deux sujets et quoique le vivant donna des marques de la plus grande vigueur, et malgré les soins recherchés que l'on apris pour prolonger sa vie, il n'a pû survivre que dix neuf heures à l'autre. On auroit souhaité conserver les deux sujets plus longtems; la tendresse mal Entendue des parens s'y opposá, il fallût faire l'ouverture des petits cadavres a la hate en voicy le resultat, Nous avons

[Stamp: Académie nationale de médecine Bibliothèque]
ARC 26 n°58

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C — 11

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

63

58

Commencé par Enlever les Teguments, et nous avons remarqué que la partie anterieure inferieure du thorax etoit jointe immediatement, la ligne blanche qui parroissoit unique, repondoit a L'umbilic commun; ayant incisé les teguments jusqu'au Pubis on à trouvé que les muscles abdominaux de l'un et de l'autre sujet, etoient dans leur conformation ordinaire, a la separation desquels on à reconnû que le peritoine etoit commun; ayant soulevé le peritoine divisé, on a remarqué que l'Epiploon etoit commun, et que le foye aussi commun, occupoit la region Epigastrique des deux sujets, formant un quarré long irregulier avec une seule scissure, où se portoit ~~t~~ la veine umbilicale: on a cependant reconnu deux vesicule de fiel, logées l'une adroite et l'autre agauche dans l'Enfoncement qui est sous le grand lobe du foye. Chaqu'enfant avoit un ventricule ou Estomacts accompagné chacun de leur Duodenum, qui se reunissans dans leurs parties Inferieures ne formoient plus qu'un seul canal qui donnoit Naissance au Jejunum a peû prés dans sa longueur ordinaire.

Ce Jejunum, bifurqué dans la partie inferieure produisoit en particulier a chaque sujet un Ileon de grandeur ordinaire; dans la partie inferieure duquel se rencontroit l'intestin cœcum avec son appendice Vermiculaire, mais moins volumineux qu'il ne l'est ordinairement dans les sujets de cet age; le colon qui est une continuité de ce canal, à paru etre conformé a l'ordinaire ainsi que le rectum; Chaque sujet avoit une ratte, une vessie, et une matrice; a legard de la poitrine, on à remarqué que le diaphragme etoit commun et que chaqu'enfant avoit un cœur et un Poulmon propre.

On Regrette avec raison de n'avoir pû faute de tems, Etendre davantage les observations, sur un fait autant curieux qu'il est rare; temoins en sont des Bisarreries de la nature et de ses caprices, nous osons assurer qu'elle ne les combina jamais avec plus de singularités, que dans Le phenomene des deux Enfans unis, et ne merita par consequent un Examen plus scrupuleux.